

CLEF de *jurtina*, *lupina*, *lycaon* traduite d'après Raniero

Autore



Discussione



Raniero

Moderatore



Città: Ceccano
Prov.: Frosinone

Regione: Lazio

Offline

689 Messaggi
Tutti i Forum



Inserito il - 28 agosto 2009 : 00:27:33



On m'a demandé dans cette précédente discussion :

http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89925

d'éclaircir les principaux caractères discriminants entre *Maniola jurtina* et *Hyponephele lupina*. Je précise que mes observations sont limitées aux exemplaires trouvés dans le Latium et les Abruzzes donc, elles peuvent ne pas prendre en compte la variabilité qui pourrait être présente dans d'autres zones de distribution.

Avant tout, je peux affirmer qu'ici en Italie centrale les *Hyponephele* s'observent seulement en montagne alors que *M. jurtina* est répandue un peu partout.

Partons de cette brève séquence qui montre un mâle et une femelle d' *Hyponephele lupina* dans une tentative d'accouplement:

Imagine:



222,45 KB

Aucun doute qu'il s'agit de *H. lupina* dans la mesure où on voit aussi la face supérieure des ailes qui chez le mâle (en bas) présente seulement une petite ocelle et la tache androconiale sur un fond brunâtre assez uniforme et chez la femelle (en haut) présente deux ocelles cerclés de fauve.

A remarquer que le côté inférieur de l'aile postérieure présente une couleur brun grisâtre légèrement "jaspé" mais plutôt uniforme sans dessin ou bande, comme chez ce mâle (qui a une seule ocelle sur le côté inférieur de l'ailes):

Imagine:



255,89 KB

Le mâle de *M.jurtina* présente le côté inférieur de l'aile d'une couleur de fond brunâtre plutôt uniforme et il y a toujours vers le bord de l'aile des petites ocelles (chez quelques exemplaires que j'ai photographiés il y en a 5-6 alignées):

Imagine:



227,59 KB

Chez la femelle de *M.jurtina* l'aile postérieure présente une bande claire nette qui contraste avec la portion basale et terminale de l'aile qui sont plus foncées:

Imagine:



255,74 KB


Enfin : un exemplaire de *Hyponephele lycaon* (cette fois une femelle parce qu'elle a deux ocelles) chez laquelle l'aile postérieure présente (contrairement à *lupina*) un dessin ondulé qui sépare la portion basale plus foncée de l'aile de la bande post-discale plus claire:

Imagine:





274,42 KB

J'(Raniero) espère avoir été clair.



***Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)**

Retro



***Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775)**